

# 莫名发烧竟是感染致命病菌

本报讯(记者 魏薇 通讯员 王红)去了一趟柬埔寨，竟然感染了一种罕见的类鼻疽伯克霍尔德菌，有致命风险。经山医大二院多学科协作治疗，田先生的感染得到了有效控制。7月4日接到医生打来的随访电话，已经出院的田先生不禁感叹自己真是捡回了一条命。

4月中旬，田先生因上臂肿胀疼痛、发红发烫，肺部多发病灶合并高热，赶到山医大二院急诊科就诊。接

诊医生初步检查，并询问旅居史得知，田先生曾到过柬埔寨。初步判断患者病情不简单，急诊医生立刻通知呼吸与危重症医学科的医生前来接诊。患者的种种症状让接诊医生提高警惕，考虑到可能感染了某种特殊病菌，医生立即展开相关检测，同时安排单间隔离病房收治患者。经过血液学二代测序检测，医生确诊田先生感染了类鼻疽伯克霍尔德菌，是我省首例重型类鼻疽感染者，并第一时间上报医院

预防保健科及疾控部门。

面对如此罕见且病情严重的患者，山医大二院迅速启动多学科协作机制。该院的呼吸与危重症医学科、药敏室、药学部、超声诊断科、骨科、院感科及预防保健科等多个科室的专家纷纷赶来，共同研讨治疗方案。医生先通过负压引流，为患者排出大量气体及脓液后，使其体温恢复正常，但左臂活动仍然受限。医务人员咨询了海南省的专家组，评估决定暂不实施手术。最终，

专家们又通过药物治疗，使得田先生的感染病灶得到有效控制，目前已出院并在院外继续接受抗感染治疗。

据介绍，类鼻疽伯克霍尔德菌是一种广泛分布于环境中的腐生菌，主要来源于热带地区的潮湿土壤、积水、水稻田、烂泥地等环境中。我国类鼻疽的高发区域主要在东南沿海地区。罹患类鼻疽病，若未及时就医，可出现全身播散性感染，甚至导致死亡，病死率达30%。

## 人乳头瘤病毒疫苗 7月9日线上预约

本报讯(记者 刘涛)市卫健委7月4日发布消息，新一轮四价、九价人乳头瘤病毒(简称“HPV”)疫苗线上预约于7月9日开始，预约时间为当日9时30分至15时30分。本轮四价共有名额232人，九价共有名额1712人，约完为止。

四价、九价HPV疫苗适用人群为9岁至45岁女性。本次四价、九价HPV疫苗预约依托“山西疾控动态”微信平台，实行网络实名预约。市民可关注微信公众号“山西疾控动态”，点击“疾控服务”—“预防接种服务”—“绑定本人信息(成人)”—“接种预约”—“选择四价或九价HPV疫

苗”—“接种单位”—“选择接种时间”—“确认登记预约”。预约成功后，可在预约接种服务中“我的”—“成人疫苗预约单”中查询预约记录。预约结束后，预约成功人员名单将在各接种单位公示。

市卫健委有关负责人提醒，预约成功的接种名额仅限本人使用，不得转让。为提高预约效率，建议市民可提前关注公众号，在预防接种服务中按照指南提前做好受种者绑定操作。一个身份证号、一台设备只能预约一次，市民要通过官方正规渠道预约，不要相信“代抢”“代约”等非正规方式，避免上当受骗。

## 21枚肌瘤被剔除 患者子宫保住了


本报讯(记者 刘涛)太原市人民医院妇产科医护团队近日完成了一例极具挑战性的子宫肌瘤剔除手术，为患者剔除21枚肌瘤，包括6枚较大肌瘤，最大肌瘤的尺寸达到8厘米×7厘米，患者子宫得以完整保住。

46岁的张女士，患有多发性阔韧带肌瘤和宫颈肌瘤。在过去5年中，张女士辗转多家医院求治，均被建议实施子宫切除手术。然而，她坚定地表达了保留子宫的强烈愿望，不愿接受子宫全切除手术。这一决定导致她长期遭受慢性失血性贫血状况的困扰，血红蛋白水平一度降至78克/升。

经过详细检查，发现张女士的肌瘤不仅数量众多，而且分布广泛，位置特殊，手术中稍有不慎就可能引发严重的出血风险，手术难度极高。经过与张女士及家属的充分沟通，该院妇产科主任、主任医师刘银凤带领手术团队对患者病情进行综合评估，决定实施子宫肌瘤剔除术，并保留子宫。

通过输血治疗改善贫血状况后，该团队为患者制订了详细的手术方案，在妇产科、手术麻醉科等科室的协同配合下，最终为张女士成功剔除21枚肌瘤，子宫还得以完整保留下。目前，患者身体已经恢复良好。

## 疾控专家提醒 虫媒传染病发生风险增加



新华社长沙7月4日电(记者 帅才)近日，多地遭遇暴雨洪涝灾害，一些群众接触疫水增多，使得虫媒传染病发生风险增加。疾控专家提醒，群众应做好个人防护，注意避免昆虫(如蜱虫、蚊子等)叮咬，防止虫媒传染病的发生。

“灾区群众需要积极预防血吸虫病。”湖南省疾控中心主任医师刘富强介绍，血吸虫病是人兽共患病，群众可因接触疫水、喝生水导致感染血吸虫病。血吸虫临床表现复杂多样，发生急性血吸虫病，会出现发热、食欲减退、腹部不适、肝脾大等症状。

刘富强提醒群众，近期需要做好

登革热的预防工作。登革热主要经伊蚊(俗称“花斑蚊”)叮咬传播，夏季高发。登革热是一种全身性疾病，临床症状包括发热、剧烈头痛、全身肌肉痛、可伴有面部潮红、结膜充血、多样性皮疹等症状。

专家提醒群众，尽量避免接触流行区疫水，要吃熟食，不要喝生水；因生产生活、抗洪救灾等必须接触水体的人群，要采取必要的防护措施，涂抹防护油膏或穿戴防护用具；外出尽量穿长袖衣裤，科学使用蚊虫驱避剂等驱蚊产品，避免被蚊虫叮咬；一旦被蚊虫叮咬之后出现发热、头痛、腹部不适等症状，要及时到医疗机构就诊。

## 卫生健康

—创卫在行动

## 非哺乳期也会患上乳腺炎

35岁的李女士，最近发现自己左侧乳房出现一个硬块，伴有疼痛和红肿。经检查，被确诊为非哺乳期乳腺炎。不在哺乳期，乳房也会有炎症？太原市妇幼保健院乳腺科主任姚亚峰提醒，女性在非哺乳期也会患上乳腺炎，需要注意的是，这种乳腺炎比哺乳期的乳腺炎更为严重，非哺乳期乳腺炎可能悄无声息地影响着每一位女性，早发现、早诊断、早治疗是关键。

近年来，随着孕期和产褥期卫生知识的普及，哺乳期乳腺炎的发病率已呈下降趋势，而非哺乳期乳腺炎则呈上升趋势。“非哺乳期乳腺炎是一

种多发生在非哺乳期的乳腺炎性疾病，主要发生于30岁至40岁左右的有生育哺乳经历的女性。”姚亚峰说，该病以乳房肿块、疼痛为初期症状，起病急，往往在一周以后就可以在超声下有化脓表现，常反复发作，可破溃流脓形成窦道，经久不愈。乳腺外伤是主要的诱发因素，好多女性是由于孩子头部撞击，或者踢踹乳房后出现乳房肿痛发病的。该病的病因不明，目前已知与内分泌激素变化、自身免疫性因素等有关，与先天性乳头内陷、吸烟等生活不良习惯相关。根据病理及临床表现的不同，可分为浆

细胞性乳腺炎、肉芽肿性乳腺炎。

如何诊断患有非哺乳期乳腺炎？姚亚峰提醒，如有乳房肿块(常为首发症状，肿块质地硬，边界不清)；乳房疼痛(可为隐痛、刺痛或胀痛)；乳房皮肤改变，如皮肤红肿、橘皮样改变；乳头溢液，可能出现浆液性或脓性分泌物；腋窝淋巴结肿大，部分患者可出现；全身症状，病情严重时，可伴有发热等全身症状；病情易反复，治疗后容易复发。“病理诊断是诊断非哺乳期乳腺炎的金标准。”姚亚峰提醒，一定要做病理诊断，因为炎性乳癌也会有乳腺炎的表现，往

往会造成误诊。

如何预防非哺乳期乳腺炎复发？姚亚峰强调，一定要定期随访，密切观察病情变化，根据需要调整治疗方案；保持良好的生活习惯，注意乳房卫生；保证充足睡眠，合理饮食，避免劳累。

“非哺乳期乳腺炎可能悄无声息地影响着每一位女性，早发现、早诊断、早治疗是关键。”姚亚峰提醒，非哺乳期女性(也有少量哺乳期及妊娠期)，当乳房出现不明原因的明显疼痛，并短时间内疼痛部位出现肿块，伴随局部红肿，就要高度重视，及时就诊。

记者 刘涛